

インフルエンザ予防接種予診票

該当する箇所に○をつけて下さい

12歳以下の方は原則2回接種となります

☐ 1回のみ		来院する直前に自宅で体温測定し記入してください↓			
☐ 1回目					
☐ 2回目					
住所					
フリガナ		男・女	生年	S	年 月 日
受ける人の名前			月日	H	
保護者の名前			R	(満 歳 ヶ月)	

今日受ける予防接種について裏面にある説明文を読んで理解しましたか。	はい	いいえ
現在、何かの病気で医師にかかっていますか。	はい	いいえ
その場合、治療(投薬など)を受けていますか。 病名()		
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。	はい	いいえ
今までに特別な病気(心臓血管系・腎臓・肝臓・血液疾患・免疫不全・その他の病気)にかかり医師の診察を受けていますか。 病名()	はい	いいえ
今日体に具合の悪いところがありますか。	はい	いいえ
具体的な症状を 書いてください。()		
最近1ヶ月以内に予防接種を受けましたか。「はい」の場合は下記にご記入ください。	はい	いいえ
予防接種(インフルエンザも含む)の種類() いつ (月 日)		
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか。	はい	いいえ
予防接種の種類()		
ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか。	はい	いいえ
薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことはありますか。(何で)	はい	いいえ
ひきつけ(けいれん)をおこしたことがありますか。()歳頃	はい	いいえ
その時熱が出ましたか。	はい	いいえ

予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性などについて 理解した上で、接種を希望しますか。 (接種を希望します ・ 接種を希望しません)	本人署名(ただし18歳未満の方は保護者自署) 令和 年 月 日 署名:
--	---

医師の確認 _____

インフルエンザワクチンの接種について

【ワクチンの効果と副反応】

予防接種により、インフルエンザ感染を予防したり、症状を軽くすることができます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれることがあります。通常は2～3日で消失します。発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・吐気、下痢、関節痛、筋肉痛なども起こることがありますが通常は、2～3日で消失します。過敏症として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、かゆみなどもまれに起こります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー様症状(蕁麻疹、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作。このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人又は家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

【予防接種を受けることができない人】

- 1、明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)
- 2、重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 3、過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーを起こしたことがある人
なお、他の医療品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで下さい。
- 4、その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

【予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人】

- 1、心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 2、発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 3、カゼなどのひきはじめと思われる人
- 4、予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 5、薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
- 6、今までにけいれんを起こしたことがある人
- 7、過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことがある人
- 8、妊娠の可能性のある人
- 9、気管支喘息のある人

【ワクチン接種後の注意】

- 1、インフルエンザワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応が起こることがあります。
医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 2、接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすことはやめましょう。
- 3、接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 4、万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。

体温測定についてのお願い

来院する直前に自宅で体温測定し、予診票に記入してください